



Allgemeine Entwurmungsempfehlung im Jahresüberblick

Januar			
Februar			
März		Equimax	Frühjahrsbehandlung [Palisadenwürmer, Spulwürmer, Pfiemenschwänze u. Bandwürmer]
April	Weidesaison	Jernadex (Banminth)	Bei Weidegang: alle 6-8 Wochen gegen Palisadenwürmer, Spulwürmer u. Pfiemenschwänze
Mai			
Juni			
Juli			
August			
September			
Oktober			
November			
Dezember		Eraquell	Behandlung gegen Magendasseln, Palisadenwürmer, Spulwürmer u. Pfiemenschwänze



Dr. Stephan Schubert · Barmerstraße 37 · 42899 Remscheid

Tierärztliche Praxis
Dr. Stephan Schubert
Fachtierarzt für Kleintiere
Master of Small Animal Science (M.Sc.)
Fachtierarzt für Pferde

Barmer Str. 37
42899 Remscheid

02191 - 463 888
0170 - 29 888 21



Sprechstunden:

Mo.-Fr. 09.00 - 11.00 Uhr
17.00 - 19.00 Uhr

Sa. 10.00 - 11.00 Uhr

www.tierarzt-schubert-remscheid.de
info@fachtieraezte-remscheid.de

Stallhygienische Maßnahmen:

- Regelmäßige Erneuerung der Einstreu
- Stallreinigung mit Dampfstrahlgerät
- Anschließende Desinfektion (z.B. Peressigsäure)
- Fütterung aus Raufen
- Wände trocken halten

Weidehygienische Maßnahmen:

- Weidepflege (Absammeln des Kotes)
- Überbesatz der Weideflächen vermeiden
- Regelmäßiges Wechseln der Koppeln
- Mineraldüngemittel wie z.B. Ammonsalpeter, Nitrophosphat und Superphosphat sind gegen einige Wurmlarven auf der Weide wirksam
- Keine gemeinsame Beweidung mit Eseln
- Wechselbeweidung mit Wiederkäuern nur im Jahresrythmus

In Problembeständen sollte eine regelmäßige Kotuntersuchung erfolgen!

Bei positiven Befunden von Magendarmstrongyliden ist eine Larvenbehandlung mit z.B. **Panacur** (Fenbendazol) an 5 aufeinander folgenden Tagen anzuraten.

Bei Fohlen sollte die erste Behandlung gegen Zwergfadenwürmer nach der ersten Lebenswoche erfolgen, und alle 1-2 Wochen wiederholt werden (z.B. mit Panacur für das dreifache Körpergewicht).

Im Alter von 8 Wochen folgt die erste Behandlung gegen Spulwürmer und Palisadenwürmer, die alle 6-8 Wochen wiederholt wird.